PHASE 3 – COVID-19

Arbre décisionnel de prise en charge d'un enfant suspect Covid+ en médecine de ville – 13 mars 2020

Symptômes

Syndrome viral respiratoire haut ou bas
et/ou
Toux
et/ou
Fièvre
et/ou
Céphalée
et/ou
Asthénie
et/ou
Diarrhée

- Toute personne présentant un **SDRA** (syndrome de détresse respiratoire aiguë) dans un contexte possiblement viral et sans autre étiologie évidente d'emblée.
- Toute personne présentant des signes cliniques de **pneumonie aiguë** (grave ou non) sur un terrain fragile présentant au moins **une comorbidité**.

Hospitalisation via Centre 15

Facteurs de Comorbidité +/- :
- BPCO (mucoviscidose, DDB) Asthme stade 4 et 5, Malformation pulmonaire restrictive
- Cardiopathie congénitale sévère
- Chimiothérapie, traitement immunosuppresseur pour maladie rhumatismale, néphropathie ...
- Environnement familial et social défavorable
- Présence à domicile d'une personne fragile

OUI

Bonne tolérance clinique (Pouls, TA, F respiratoire SaO2 si saturomètre)

NON

OUI

- Confinement 14 jours
- Remettre fiche « Enfant COVID19 à domicile »
- Sous surveillance médicale :
  - consultation ou téléconsultation et/ou
  - visite infirmière programmée dans les 4 à 6 jours (aggravations fréquentes en fin de première semaine à compter de la survenue des symptômes)

NON

Si <u>aucun</u> facteur de comorbidité et état clinique stabilisé :

- Confinement 14 jours recommandé
- Remettre fiche de recommandations « Enfant COVID19 à domicile »

ars Agence Régionale de Santé Île-de-France
URPS MÉDECINS LIBÉRAUX ILE-DE-FRANCE